



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

**CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CHIȘINĂU**

MD 2021, mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu 49, Tel. +373 22 574 300; Fax. +373 22 574 300,  
<http://www.ansp.md> e-mail [csp.chisinau@ansp.gov.md](mailto:csp.chisinau@ansp.gov.md); IDNO: 1018601000021

*18.07.21 Nr. 02-8/2991*

Lă nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Dlui Andrei PAVALOI,  
Şef adjunct,  
Direcția Generală Educație,  
Tineret și Sport a Consiliului  
municipal Chișinău  
str. M. Dosoftei, 99  
e-mail: [dgetsmun@gmail.com](mailto:dgetsmun@gmail.com)

Privind agravarea situației  
epidemiologice prin infecția  
enterovirală, măsurile de  
prevenire și control a infecției

Centrul de Sănătate Publică Chișinău, Vă aduce la cunoștință că, începând cu luna iulie curent, în mun. Chișinău, se atestă o sporire a morbidității prin infecția enterovirală. Dacă în primele 6 luni ale anului curent s-au înregistrat 27 cazuri de infecție enterovirală, atunci în primele 8 zile a lunii iulie, au fost înregistrate deja 57 cazuri.

Necesită de menționat, că 56 cazuri de boală, sau 98,3%, au fost înregistrate printre copii. Cota copiilor cu vârstă 0-2 constituie 46,4% (26 cazuri), cu vârstă 3-6 ani – 41,1% (23 cazuri). Copiii instituționalizați constituie 46,4% (26 de cazuri).

În cadrul evaluării situației epidemiologice s-a stabilit: infecțiile enterovirale se caracterizează printr-o evoluție ciclică cu o perioadă de creștere la 3-4 ani, ultima creștere a morbidității în mun. Chișinău s-a atestat în anul 2019, când au fost înregistrate 805 cazuri de infecție enterovirală, inclusiv 11 cazuri de meningită seroasă. Numărul maximal de cazuri a fost înregistrat în anul 2008: 1150 cazuri de infecție enterovirală, inclusiv 340 cazuri de meningită aseptică. Perioada de creștere a morbidității caracteristică infecției enterovirale sunt lunile mai – septembrie, în anul curent debutul creșterii sezoniere a morbidității a avut loc în luna iunie. Sursa de infecție este bolnavul și purtătorul de enterovirus, calea de transmitere fecalo-orală și respiratorie. Preponderent sunt afectați copiii, inclusiv cei instituționalizați cu vârstă 3-7 ani, cu apariția cazurilor de boală solitare, în

grup și cu transmitere secundară în familie. Perioada de incubație este în medie 3-7 zile, cu simptome clinice similare: febră, enterită acută, meningită, erupții pe piele, afecțiuni ale căilor respiratorii superioare.

Luând în considerație potențialul înalt de răspândire a enterovirusului și perioada sezonieră de sporire a infecției, pentru prevenirea apariției și răspândirii infecțiilor enterovirale, CSP Chișinău recomandă:

- ✓ 1. Familiarizarea personalului instituțiilor preșcolare privind măsurile profilactice și antiepidemice în caz de înregistrare a infecției enterovirale, inclusiv și menișgitei seroase;
2. Afisarea materialelor vizuale pentru părinți și personal privind prevenirea infecțiilor enterovirale;
3. Asigurarea unui control strict asupra respectării cerințelor sanitare în instituțiile preșcolare:
  - 3.1. Efectuarea calitativă a trieriei matinale în instituțiile preșcolare întru depistarea precoce și izolarea suspecților și bolnavilor de boli infecțioase: discuția cadrelor cu părinții, privind starea de sănătate a copiilor (prezența febrei, durerilor de cap, greșurilor, vărsăturilor, durerilor în gât, durerilor abdominale și altor plângerii), măsurarea temperaturii corpului;
  - 3.2. Monitorizarea zilnică a frecvenței copiilor din instituțiile preșcolare cu stabilirea motivului copiilor absenți;
  - 3.3. Limitarea participării copiilor la diferite manifestări în locurile aglomerate (cinematografe, teatre etc.);
  - 3.4. Igienizarea regulată și calitativă a încăperilor (aerisirea, deriticarea umedă, cu folosirea substanțelor dezinfecțante cu acțiune virulicidă);
  - 3.5. Respectarea strictă a igienei personale de către copii și personal;
  - 3.6. Folosirea apei și a produselor alimentare de calitate garantată. (Atenție! Filtrele habituale nu asigură inofensivitatea apei);
  - 3.7. Evitarea scăldatului în bazinele neamenajate sau în locurile unde este interzis scăldatul.
4. Efectuarea măsurilor antiepidemice în caz de înregistrare a infecției enterovirale:
  - 4.1. Izolarea temporară a bolnavului sau suspectului, în caz de depistare în timpul frecvențării instituției;
  - 4.2. Declararea cazurilor la Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău;
  - 4.3. Supravegherea medicală a persoanelor aflate în contact cu bolnavul. Durata supravegherii medicale, după izolarea bolnavului cu infecția enterovirală, în termen de 10 zile și 20 de zile în caz de meningită seroasă, cu introducerea rezultatelor supravegherii în documentele medicale relevante (foi de observație);
  - 4.4. Aerisirea regulată a încăperilor în absența copiilor, cel mai eficient - trans-ventilație;
  - 4.5. Dupădezinfecția finală, covoarele, jucăriile umplute și cele moi se elimină din grupe;

- 4.6. Vesela curătată de resturi de alimente se scufundă într-o soluție dezinfectantă, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia cu efectul asupra virusurilor;
- 4.7. Tratarea jucăriilor se efectuează de 2 ori pe zi cu detergenți și la sfârșitul zilei - cu dezinfectanți;
- 4.8. Deriticarea umedă în spațiile de grup se efectuează după fiecare masă cu utilizarea dergenților, la sfârșitul zilei de lucru, cu utilizarea dezinfectanților;
- 4.9. Blocurile sanitare sunt supuse deriticării cel puțin 2 ori pe zi, cu utilizarea dezinfectanților;
- 4.10. Admiterea copiilor noi în grupa afectată sau transferul din grupă în grupă a copiilor și personalului nu sunt permise;
- 4.11. Admiterea în colectivități a copiilor bolnavi se admite numai după însănătoșire, cu prezentarea certificatului medical.

Şef CSP Chişinău



Eudochia TCACI

Ex. Gh.Turcu  
tel. 022-574-335